




Auteur du post

21 juillet 2017 · Lyon

Bonjour

J'ai une petite question nous partons en vacances Demain et mon fils commence une nouvelle phase de traitement antibiothérapie.. Dr R nous a dit qu'il y a un jour ou il risquerait de se vider... pensez vous que je puisse décaler ce traitement ? J'attends la réponse du docteur ... vos enfants on eu ce traitement ?



J'aime

Commenter

1

Flagyl...!? Vous avez lu la liste des effets secondaires de cet antibiotique??? Flippant je trouve... Même pour moi qui suis adulte je ne le prendrait pas!!

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 10:49 (42 sem)

Masquer 29 réponses

Auteur du post Non je l'ai pas encore acheté .. c'est quoi les effets ?

J'aime

Vincent Dennerly Tous les antibiotiques et pour ainsi dire tous les médicaments ont une liste d'effets secondaires..

de leur fréquence et de leur intensité !  
 Beaucoup d'enfants de ce groupe ont eu du Flagyl sans effet indésirable particulier, je ne vois pas l'intérêt d'inquiéter exagérément des parents sur ce produit.

En tout cas, c'est un médicament très efficace pour détruire plusieurs bactéries intestinales.

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:11 (42 sem) 2

**Auteur du post** Vincent Dennery merci de votre réponse j'ai déjà contracté le docteur on va décaler le traitement comme nous serons 2 semaines en vacances... je lui ai dit que j'arrêtais immédiatement s'il y a des effets secondaires

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:18 (42 sem)

Vincent Dennery Tout simplement parce que la liste des effets secondaires de cet antibiotique en particulier est longue comme le bras...

Mises en garde et précautions d'emploi  
 Avant d'utiliser FLAGYL, prévenez votre médecin si vous présentez :

- des troubles neurologiques,
- des troubles psychiatriques,
- des troubles sanguins,
- des antécédents de méningites sous métronidazole.

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par FLAGYL:  
 Dès la première dose, il existe un risque de survenue de réaction allergique sévère et soudaine (choc anaphylactique, œdème de Quincke), se manifestant par les symptômes suivants: oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou évanouissements, ou vertiges lors du passage en position debout (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?).  
 Si ces symptômes surviennent, arrêtez d'utiliser ce médicament car votre vie pourrait être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin.

La survenue, en début de traitement, d'une rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules, et accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction grave appelée pustulose exanthématique aiguë généralisée (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?) ; prévenez votre médecin immédiatement car cela impose l'arrêt du traitement; cette réaction va contre-indiquer toute nouvelle administration de métronidazole seul ou associé dans un même médicament à une autre substance active.  
 Il faut surveiller l'apparition potentielle ou l'aggravation de troubles nerveux comme une difficulté à coordonner des mouvements, un état de confusion, des convulsions, et une difficulté pour parler, pour marcher, des tremblements, des mouvements involontaires des yeux, ainsi que d'autres manifestations au niveau des mains et des pieds telles que des fourmillements, picotements, sensations de froid, engourdissements, diminution de la sensibilité du toucher.  
 Ces troubles sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement. Il est alors important d'interrompre le traitement et de consulter immédiatement votre médecin. (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?)

Des troubles du comportement à risque pour le patient peuvent survenir dès les premières prises du traitement, notamment en cas de troubles psychiatriques antérieurs. Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?).  
 En cas d'antécédents de troubles sanguins, de traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin peut être amené à contrôler régulièrement par des examens sanguins votre numération formule sanguine.

Prévenez le médecin ou le laboratoire d'analyses que vous prenez ce médicament si vous devez subir un examen de laboratoire : la prise de ce médicament peut perturber les résultats de certains examens de laboratoire (recherche de tréponèmes) en positivant faussement un test (test de Nelson).

Des cas de toxicité hépatique sévère/d'insuffisance hépatique aiguë, y compris des cas entraînant une issue fatale, chez des patients atteints du syndrome de Cockayne ont été rapportés avec des produits contenant du métronidazole.

Si vous êtes atteint(e) du syndrome de Cockayne, votre médecin doit également surveiller votre fonction hépatique fréquemment pendant votre traitement par métronidazole et après le traitement.

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre le métronidazole si vous présentez les symptômes suivants:

**Auteur du post** Mon fils est non verbale donc ca me fait peur de lui donner ce médicament

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:21 (42 sem)

#### Manifestations digestives

- troubles digestifs non graves : douleurs au niveau de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhée;
- inflammation de la langue avec sensation de bouche sèche, inflammation de la bouche, troubles du goût, perte d'appétit;
- pancréatite (inflammation du pancréas) réversible à l'arrêt du traitement.
- décoloration ou modification de l'aspect de la langue (peut être provoquée par le développement d'un champignon).

#### Manifestations au niveau de la peau et des muqueuses

- bouffées de chaleur avec rougeur du visage, démangeaisons, éruption sur la peau parfois accompagnée de fièvre;
- urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque la piqure d'ortie), brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique (œdème de Quincke), choc d'origine allergique pouvant mettre la vie en jeu (voir Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL?);
- très rares cas de rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules et accompagnée de fièvre (pustulose exanthématique aiguë généralisée) (voir Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL?).
- Eruption de bulles avec décollement de la peau pouvant s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient (syndrome de Lyell, syndrome de Stevens- Johnson).
- Erythème pigmenté fixe : éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de brûlure laissant des taches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament

#### Manifestations nerveuses

- atteinte des nerfs des membres (neuropathie sensitives périphériques) se traduisant par les manifestations au niveau des mains et des pieds telles que des fourmillements, picotements, sensations de froid, engourdissements, diminution de la sensibilité du toucher
- maux de tête;
- vertiges
- convulsions
- confusion
- troubles neurologiques appelés encéphalopathies ou syndrome cérébelleux, se traduisant par un état de confusion, des troubles de la conscience, du comportement, des difficultés à coordonner les mouvements, des troubles de la prononciation, des troubles de la marche, des mouvements involontaires des yeux, des tremblements. Ces troubles sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement et peuvent être associés à des modifications de l'imagerie médicale (IRM). D'exceptionnels cas d'évolution fatale ont été rapportés (voir Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL?).
- méningite non microbienne.

#### Troubles psychiques

- hallucinations,
- troubles de la personnalité (paranoïa, délire) pouvant s'accompagner d'idées ou d'actes suicidaires (voir Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL?);
- tendance à la dépression.

#### Troubles visuels

- troubles visuels passagers tels que vision trouble, vision double, myopie, diminution de la vision, changement dans la vision des couleurs ;
- atteinte/inflammation du nerf optique.

#### Troubles sanguins

## BIOMed & Teds

Groupe fermé

Manifestations au niveau du foie

- Augmentation des enzymes hépatiques (transaminases, phosphatases alcalines) ;

- très rares cas de maladie grave du foie (parfois accompagnés de jaunisse) notamment des cas d'insuffisance hépatique nécessitant une transplantation.

Autres

- coloration brun-rougeâtre des urines due au médicament.

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 11:24 (42 sem)

L'expérience que j'ai du Flagyl avec ma fille (traitement de clostridium difficile) et (fluconazole pour candidose): troubles digestifs, maux de ventre et nausées et donc irritabilité et agitation. Je crois qu'il faut bien observer votre enfant et faire en fonction de ses réactions. Bon courage

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 11:29 (42 sem)

**Auteur du post** flucomazole il l'a eu et l'aura encore il est irritable , il a constamment faim et très excité à du mal à s'endormir après je sais pas s'il a mal au ventre il parle pas

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 11:31 (42 sem)

C est difficile je sais. Ma fille avait le ventre gonflé. Mais elle est capable de me dire bobo et de me montrer. Mais bon c est une enfant hyper sensible au niveau digestif depuis la naissance

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 11:40 (42 sem)

**Vincent Dennerly** Ce qui est complètement idiot c'est que très souvent l'élimination des bactéries ou champignons intestinaux provoque dans les premiers jours des réactions paradoxales (die off lié à des largages de toxines = forte irritabilité). Il faut savoir cela sinon on pense à un effet indésirable, on stoppe le médicament et on passe à côté du traitement.

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 11:43 (42 sem)

C est vrai aussi. C est pour cela que nous continuons...mais dans la douleur bien souvent 😞

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 11:45 (42 sem)

**Auteur du post** Vincent Dennerly nous on continue Aussi mais ca s'arrête un moment ?

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 11:52 (42 sem)

**Vincent Dennerly** Une irritabilité qui se maintiendrait au delà de 4 jours doit faire questionner les traitements et suppléments. Même les suppléments peuvent avoir de vrais effets indésirables.

Ce qui aide à la décision est que la réaction d'élimination, die-off ou Herxheimer, est qu'elle joue surtout sur l'irritabilité...et en cas de traitement intestinal, sur des diarrhées passagères.

Si l'enfant présente d'autres symptômes plus typiques d'intolérance au médicament (nausées, choc allergique,...), évidemment il devient impératif d'arrêter.

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 15:33 (42 sem)

**Auteur du post** Vincent Dennerly il prend pas de supplément ca fait 5 jours qu'on a arrêté le premier traitement pour paSse au deuxième mais la il est hyper énervé affamé nous partons Demain pour deux semaines de vacances ca promets on Attends pour commencer le nouveau traitement


[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017, 18:41 (42 sem)

**Vincent Dennerly** pardonnez moi quel était le 1er traitement ? Fluvermal seulement ? Et aucun autre changement alimentaire ?

Dans ce cas, l'irritabilité et la faim pourraient être liés à la candidose ou aux bactéries intestinales...A t il aussi des rires sans raison, répétitifs ?

[J'aime](#) · [Répondre](#) · vendredi 21 juillet 2017 21:54 (42 sem) · Modifié

Discussion instantanée (3)



J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 21:57 (42 sem)

**Auteur du post** Vincent Dennerly plus régime sans gluten sans sucre sans lactose on a essayé au mieux de les diminuer il reste Des traces dans l'alimentation

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 21:58 (42 sem)

**Auteur du post** Vincent Dennerly non pas souvent mais ca arrive quand il est excité 😊

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 21:59 (42 sem)

**Vincent Dennerly** Pas facile de vous donner une réponse super cohérente. Si votre fils est réellement sensible caséine / gluten (je vous rassure ce n'est pas le cas de tous les enfants TSA...), alors l'élimination imparfaite de ces protéines, met l'enfant dans un état de sevrage permanent qui peut le rendre très irritable. Si le régime SGSC ne semble pas changer grand chose, alors c'est vraiment la piste infections intestinales qu'il faut faire en totalité...

Mais sachez que les approches biomédicales dans les TSA nécessitent d'être extrêmement rigoureux et méthodique et de vérifier les hypothèses les unes après les autres.

1. Valider ou non la piste du régime Sans Gluten Sans Caséine (attention je ne parle pas du lactose qui est le sucre du lait, je parle bien de la caséine qui est une protéine). Aucune trace, régime strict pendant au moins 3 semaines. Et vous voyez alors si cela apaise, améliore le sommeil, la concentration.
2. Si le régime ne change rien de très significatif, on passe à la piste infections intestinales (en gros l'ordonnance du Dr R).
3. Si cela ne donne rien, on passe à l'hypothèse suivante....

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 22:15 (42 sem)

**Vincent Dennerly** Donc, si j'étais vous, je tenterais pendant les vacances de tenir le régime SGSC strict 😊

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 22:16 (42 sem)

**Auteur du post** Vincent Dennerly merci pour votre aide on a remplacé les yaourts par Du soja, crème de riz... il est accro à ca... sinon il Mange rien d'autre de produits laitiers..il est très sélectif le régime nous l'avons commence y a peut près 1 mois et demi... au début on voyait qu'il était plus calme plus concentré mais Des qu'on a introduit les antibio il a commencé à s'énerver il a même recommence à vouloir mordre griffer en cas de crise

J'aime · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 03:09 (42 sem)

**Vincent Dennerly** C'est donc que la question infectieuse est prédominante.

Les antibiotiques que vous avez introduits sont uniquement le Fluvermal ou vous avez déjà donné d'autres antibiotiques avant ?

J'aime · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 13:46 (42 sem)

**Auteur du post** Flucomazol, combantrin et Zithromax

J'aime · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 16:04 (42 sem)

Si je peux me permettre le soja c'est pas top du tout . Il y a des yaourts très bons au lait de riz ou chanvre chocolat fruits rouges ou passion chez biocoop

J'aime · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 19:29 (42 sem)

**Auteur du post** pas bon du tout ? J'ai trouvé que yaourt au lait de riz chocolat chanvre vous donnez de l'huile de chanvre votre ?

Non mais il y a des yaourts au chanvre.  
 Oui mon fils en mange. C est riche en om3 . Pour le soja c est un phytoestrogene pas top pour un garçon... en petite quantité de temps en temps pas de soucis mais pas tous les jours  
 J'aime · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 22:22 (42 sem) · Modifié

C est cette marque :   
<http://www.sojade.fr/.../dessert-chanvre-fraise-framboise/>.  
 Attention ils font aussi a base de soja il faut pas se tromper

 **Dessert chanvre fraise framboise - Dessert Sojade**  
  
 SOJADE.FR

J'aime · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 22:27 (42 sem)

 **Vincent Dennery** Le fond du problème est plus infectieux qu'alimentaire. C'est la raison pour laquelle le médecin prescrit ces médicaments.

Quels résultats avaient donné LA 1ère cure Zithromax ET Fluconazole ?

J'aime · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 23:52 (42 sem)

**Auteur du post** Vincent Dennery pas grand chose à part la fringale, l'irritabilité, il recommence à vouloir mordre les troubles qui étaient parti reviennent

J'aime · Répondre · dimanche 23 juillet 2017, 00:54 (42 sem)

Répondez...

**ADMIN** On va arrêter le délire sur la liste des effets secondaires potentiels svp. Mon fils en a pris comme plusieurs autres enfants qui ont suivi une antibiothérapie il l a bien supporté et aucune catastrophe ! Il y a un suivi médical s il y a un soucis le médecin sait quoi faire.

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 14:26 (42 sem)

Ce n est peut etre pas utile de le dire comme ca. Cette maman se renseigne comme nous tous. Son enfant comme beaucoup ne parle pas ce qui rend les choses compliquées.

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 14:47 (42 sem) 1

ne répondait à la maman qui posait la question

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 15:55 (42 sem) 1

Ok j'ai mal compris alors

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 15:58 (42 sem)

**ADMIN** Non je réagissais sur la publication anxiogène de la liste des effets secondaires potentiels

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 16:39 (42 sem) 1

Ouf 😊  
 J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 16:41 (42 sem)

Répondez...

Pas de souci de décaler une journée a mon avis. Ça nous est arrivé et le docteur ne nous l'a pas reproché. Bon courage.

J'aime · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 14:27 (42 sem)

Chez nous, le protocole est sensiblement le même à part l'antibiotique qui est différent. On jamais eu de soucis au niveau intestinal, au contraire le transit n'a jamais été aussi bien que sous antibiotique. Je pense que si vous décalez, il faut tout décaler car si l'on tue les mauvaises bactéries, il faut aussi traiter à la suite le candida qui risque de flamber. Petit conseil soutenez le foie avec du desmodium car le traitement et les toxines libérées ont tendances à l'engorger et ça se traduit par des colères. Le cina en homéopathie aide aussi.

J'aime · Répondre · dimanche 23 juillet 2017, 01:23 (42 sem)

---

J'aime · Répondre · lundi 24 juillet 2017, 18:01 (42 sem)

Répondez...

Social Fixer can prevent Enter from submitting comments & replies!  
Options Hide



**sie** Ici pas de soucis avec le traitement

J'aime · Répondre · lundi 24 juillet 2017, 15:58 (42 sem)



Coucou 😊 J'ai pas tout lu mais perso je fais entièrement confiance en notre Dr R. dans son choix de traitement pour mon fils... traitements très similaires... Bonnes vacances ☀️

J'aime · Répondre · mardi 25 juillet 2017, 22:26 (42 sem)



Votre commentaire...